

我怎樣知道是否已患上結核病?

只有你的醫生能告訴你是否已患有結核病。首先你須接受舊式的皮下測試或新採用的驗血方法作檢查。呈陽性反應則表示已經有細菌潛伏體內(感染期)，你須要照肺X光片以確定體內細菌有否破壞你的肺部而形成結核病。在醫生診斷你是否有傳染性結核病期間。你可能須要取痰樣本化驗是否有細菌存在。

如果過去測試是陽性反應或曾經服藥的話。在檢查時請告訴醫務人員。



假如我第一次試驗是陰性的話，我已安全嗎?

雖然你的第一次試驗結果是陰性，你仍然可能會有結核菌在你身體內。你需要在十二個星期後再次試驗，肯定你並未染到結核菌。

我可以到那裡接受結核病菌檢查呢?

如你曾接觸過結核病患者即可到以下地方檢查

肺結核診所地址:

Tuberculosis Clinic
SFGH Building 90, 4th Floor,
Ward 94
2460 22nd Street at Potrero Avenue
San Francisco, CA 94110
Main phone number 415-206-8524
Fax: 415-648-8369

你的家庭醫生可以替你做皮下試驗或驗血檢查

結核病

我曾接觸到結核病患者(TB)

我需要怎樣做?

如果你曾經與患有傳染性的結核病患者在一起的話，你可能已吸入一些細菌在身體內，你需要接受檢查。

不是每個人接觸到結核病患者就一定會被感染細菌。

如果一旦你被感染細菌的話，有些藥物是可以醫治及預防病情發作的。

你知道感染結核菌與患結核病有很大的分別嗎？

你不能感染結核病從：

感染結核菌

如你是大多數感染了結核菌的帶菌者。

- 你的體內潛有結核病菌
- 你並未發病及沒有病癥
- 你不會傳染給別人



活躍的結核病

如少數染上結核病患者。

- 你的體內存有活躍性的結核病菌。
- 你已發病，會有咳嗽，發燒及體重下降的病癥。
- **你須要見醫生！**
- 你可以傳染細菌給別人



細菌是從患有活躍性結核病者咳嗽或噴嚏時散播在空氣中。你只能從空氣中吸入細菌而得到結核病。

- 衣服
- 共同使用的餐具
- 食物
- 床，寢具
- 廁所板
- 握手
- 性交
- 共用針筒

